


感染症 ひとくち情報

先天性風しん症候群(CRS)について



2019 年 5 月 8 日
東京都健康安全研究センター





1. 先天性風しん症候群 (CRS) とは

先天性風しん症候群とは、風しんに対する免疫がない妊婦が、妊娠初期に風しんに罹患すると風しんウイルスが胎児に感染し出生時に障害を引き起こすことがある疾患です。妊婦が罹患した際に症状がみられなくても（不顕性感染）、胎児が先天性風しん症候群を起こす可能性があります。

主な症状は、難聴、白内障、先天性心疾患ですが、軽症例では、出生時明らかな臨床症状が無い場合もあります。

2. 発生状況


2013 年に風しんが流行し、2014 年までに都内では 16 件の報告がありました。2015 年以降発生報告はありませんでしたが、2019 年 17 週に 1 件の発生報告がありました。



3. 対策について

妊娠中に風しんに感染しないようにすることが大切です。妊娠中はワクチン接種ができないため、妊娠前にワクチン接種をして抗体をつけること、妊婦のパートナーや職場の同僚、同居の方もワクチン接種をして風しんにかからないようにすることも重要です。

特に以下の方は、抗体検査や予防接種をご検討ください。



- ① 妊娠を予定または希望している女性 ② 妊婦の同居者 ③ ①の同居者
- ④ 30 歳代から 50 歳代の男性（抗体価が低い方が 2 割程度存在しているとされています）

※抗体検査・予防接種をご希望の場合は、費用補助を実施している自治体があります。

対象や補助内容は自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

4. ワクチン接種について

(1) 定期予防接種

- ・ 1 歳以上 2 歳未満（1 期）

5 歳から 7 歳未満で小学校就学前 1 年間（2 期）

：原則的に麻疹・風しん混合ワクチン（MR ワクチン）を 1 期 2 期の期間において 2 回接種

- ・ 1962 年（昭和 37 年）4 月 2 日から 1979 年（昭和 54 年）4 月 1 日までに生まれた男性

：定期予防接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代と比べて低い世代を対象とした
時限的な対応（2022 年 3 月 31 日まで）

※十分な量の風しん抗体があることがわかり、予防接種を受ける必要がない人は除く

(2) 定期予防接種以外

- ・ 任意接種として麻疹・風しん混合ワクチン（MR ワクチン）、風しんワクチンの接種が可能
かかりつけの医師に相談してください

対象：1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様

風しん排除には—— 君たちの行動が 必要なのさ

対象の男性は
クーポン券を使って
抗体検査と
予防接種を受けようぜ ※

抗体検査を
受けてないキミたちっ！

※2019年4月以降、順次クーポン券が届く予定ですが、
自治体により事業の開始時期や対応が異なるため、
お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。

劇場版 **CITY HUNTER**
新篇 PRIVATE EYES

©北条司/NSP・[2019]劇場版「シティハンター」製作委員会

風しんから、あなた自身と周りの人を守るためにあなたにできること

1. あなたが風しんへの抵抗力があるかチェックするため、抗体検査を受けましょう。
2. 風しんへの抵抗力が無いこと（抗体なし）がわかった場合、
風しんへの抵抗力（免疫）をつけるため、予防接種を受けましょう。





風しんの感染を拡大させる可能性があります


風しんから、あなた自身と周りの人を守るために
風しんに対する抵抗力を確認・獲得しましょう

1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の方は、
風しんの抗体検査及び予防接種が原則無料*となります。

WHY?

Q:なぜ風しんへの抵抗力が必要なの?


A・成人は小児に比べて症状が重くなることがあります。



WHAT?

Q:風しんに感染すると何が問題なの?


- A・電車や職場など人が集まる場所で、
多くの人に感染させる可能性があります。
- ・妊娠早期の妊婦に風しんを感染させると、
赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可能性があります。



HOW?

Q:では、どうしたら良いの?

- A・まずは、風しんへの抵抗力を確認するため、抗体検査を受けましょう。
- 2019年4月以降、クーポン券が届きますのでクーポン券に従って抗体検査を受けて下さい。
- 2019年度は、1972(昭和47)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性に市区町村がクーポン券を送付します。
- なお、2019年度にクーポン券が送付されない対象者も市区町村に希望すればクーポン券を発行し、抗体検査を受けられます。*
- 注意:子どもの頃に風しんに感染したかどうか記憶が曖昧な場合も抗体検査を受けましょう。
- ・風しんへの抵抗力が無いこと(抗体なし)がわかった場合、
風しんへの抵抗力(免疫)をつけるため、予防接種を受けましょう。



抗体検査

職場での健康診断や近隣の
病院・診療所で受けられます。*

クーポン券を使えば抗体検査は無料となります。

抗体あり

・風しんへの抵抗力があります。

抗体なし

・風しんへの抵抗力がありません。
・風しんにかかるリスクがあります。

予防接種を受けましょう

原則無料となります。*

風しんとは

感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶき(飛沫)を吸い込んで感染します。

小児は発熱、発疹、首や耳の後ろのリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱や脳炎になって入院することがあります。

成人は高熱・発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。

先天性風しん症候群とは

妊娠初期(20週以前)に風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴を特徴とする先天性風しん症候群をもって生まれてくる可能性が高くなります。

